

North Carolina Women's Hospital

Extracción del catéter subcutáneo peritoneal

Peritoneal Port Catheter Removal

¿Cómo prepararme para la extracción del catéter subcutáneo peritoneal?

- No existe ninguna preparación especial para que le quiten el catéter.
- Puede comer y beber de manera normal.
- Debe hacer arreglos para que alguien venga con usted y la pueda llevar de regreso a su casa.

¿Qué debo esperar mientras me quitan el catéter?

- Se extraerá el catéter peritoneal en la clínica de *GYN-ONC*. El procedimiento tomará unos 30 minutos.
- Su proveedor de salud le hablará una vez más de los riesgos, qué esperar, responderá sus preguntas y le hará firmar un consentimiento.
- Es posible que quitarle el catéter sea incómodo, pero la ayudaremos a que sea lo más cómodo posible. La mayoría de las pacientes puede regresar a su casa después del procedimiento.

¿Cómo se extrae el catéter?

- La enfermera la ayudará a prepararse para el procedimiento.
- Su proveedor de salud:
 - le limpiará la piel en el sitio del catéter y le colocará paños estériles para que solo se vea el sitio del catéter;
 - le inyectará en la piel un anestésico local (es posible que sienta una pinchadura rápida, como la picada de una abeja);
 - evaluará el sitio para asegurarse de que no sienta dolor.
- Se abrirá la incisión anterior para extraer el catéter. Es posible que sienta un tirón y presión mientras le estén quitando el catéter. Avísele al proveedor si siente algún dolor.
- Su proveedor pondrá presión y podría aplicar medicamento para detener el sangrado.
- La incisión se cerrará y se colocarán suturas cutáneas adhesivas (*Steri-Strip*) sobre esta. Se colocará un vendaje de presión sobre la herida.
- La enfermera le tomará los signos vitales y revisará el sitio de la herida por si hay sangrado. Se le darán instrucciones antes del alta.

¿Cómo atender la herida después de la extracción del catéter?

- Deje el vendaje de presión en la herida por 2 días y no moje la herida. Después de 2 días, puede quitar el vendaje de presión y lavar el sitio de la herida todos los días con solo agua y jabón. No aplique crema ni loción sobre la herida.
- Llame a su proveedor de salud si:
 - la temperatura supera los 101°F (38.6°C);
 - la piel se pone roja o caliente al tacto;
 - nota mucha secreción proveniente del sitio de la herida;
 - siente dolor en el sitio de extracción que no se alivie con la medicación para el dolor

Si tiene preguntas o inquietudes, llame a la clínica de *GYN-ONC* al 919-966-6187 para hablar con una Advice Nurse durante las horas normales de la clínica (lunes-viernes 8:00 a. m. - 4:30 p. m.). Después de las horas de la clínica y los fines de semana, llame a UNC Hospitals al 919-966-4131 y pida hablar con un residente de G-Y-N de turno.

Translated by UNC Health Care Interpreter Services, 06/29/12

Approved by UNC Women's Hospital Patient Education Steering Committee on April 17, 2012